

bilobées. Incisives inférieures tricuspides. Les canines supérieures ont un fort talon. La première prémolaire, petite, a sa pointe abrasée, souvent à peine visible; la deuxième est grande et forte. La dernière molaire est plus courte que celles qui précèdent.

*Dimensions* (en millimètres). — Tête et corps, 45; queue, 20; tête, 18; oreille, 17; avant-bras, 45; pouce, 5; 2° doigt, 40; 3° doigt, 56; (savoir : 1<sup>re</sup> phalange, 30; 2° phalange, 10; 3° phalange, 16); tibia, 17; pied, 8 millimètres.

*Habitat*. — Grotte de Sarondrana (baie Saint-Augustin), côte Ouest de Madagascar (par M. Guillaume Grandidier, 19 mai 1898).

---

LISTE DES MAMMIFÈRES RAPPORTÉS PAR M. H. GADEAU DE KERVILLE  
DE KHROUMIRIE (TUNISIE OCCIDENTALE),

PAR M. E.-L. TROUËSSART.

Le voyage de M. Gadeau de Kerville dans la région montagneuse de la Tunisie avait surtout pour objet des recherches entomologiques. Cependant, chemin faisant, il a récolté tous les Mammifères qu'il a pu se procurer, et il vient de faire don au Muséum de cette intéressante collection. Je crois utile d'en donner ici la liste raisonnée :

1. RHINOLOPHUS FERRUM-EQUINUM Schreber.
2. — EURYALE Blasius.
3. MYOTIS MYOTIS (vel *murinus*) Bechstein.
4. ERINACEUS ALGIRUS Duvernoy.
5. CROCIDURA RUSSULUS LEUCODON Hermann.
6. HERPESTES ICHNEUMON Linné.
7. GENETTA AFRA BARBARA Wagner (3 peaux).
8. — AFRA BONAPARTEI Loche (7 peaux).
9. FELIS OCREATA LIBYCA Meyer.
10. MUS MUSCULUS Linné.
11. — SYLVATICUS ALGIRUS Pomel.
12. — RATTUS Linné.

Deux espèces sont particulièrement intéressantes : la Genette et le Chat sauvage (*Felis ocreata*).

La belle suite de dix peaux de Genettes que M. de Kerville a pu se procurer dans la région, montre que la sous-espèce *Bonapartei* (7 peaux) est plus commune en Kroumirie que la sous-espèce *afra* (3 peaux). Les deux races semblent bien distinctes, car, en plaçant les dix spécimens près les

uns des autres, une personne même étrangère aux sciences naturelles les distinguerait à première vue.

Le *Felis ocreata* de Gmelin, longtemps méconnu en raison des prétendus « pinceaux » qu'on attribuait aux oreilles du *Caracal à oreilles blanches* de Buffon, a été l'objet d'un récent travail de M. A.-C. Latorre <sup>(1)</sup>, qui distingue, dans le Nord de l'Afrique, trois sous-espèces : *F. o. libyca* Meyer (Tunisie), *F. o. mauritana* Latorre (Algérie et Maroc) et *F. o. Margueritei* Loche (Sahara). Étant donné l'incertitude qui règne encore sur la distinction de ces trois formes, je crois utile de donner la description de la peau rapportée par M. de Kerville :

FELIS OCREATA LIBYCA (*Meyer*). — Dessus *ondé* de gris et de roux clair, les poils roux à la base ayant vers le tiers supérieur un anneau noir et l'extrémité d'un gris presque blanc. Raie dorsale plus foncée; nuque montrant 6 à 8 raies longitudinales très peu distinctes. Face de la couleur de la raie dorsale; oreilles rousses en dehors, blanches en dedans, et sans trace de véritable pinceau. Pattes d'un roux clair en avant, plus foncé en arrière, surtout à l'aisselle, au carpe et au tarse. *Une seule barre noire* en avant des avant-bras, avec une tache blanche au-dessous. Ventre roux clair. Queue de la couleur de la raie dorsale dans sa moitié antérieure, portant dans sa moitié postérieure trois anneaux noirs et trois anneaux gris-clair ou blancs, avec le bout noir. — Longueur : tête et corps, 0 m. 64; queue, 0 m. 33 (sans la touffe terminale). — Le *F. o. mauritana* Latorre aurait sur les pattes des raies plus nombreuses : quatre en avant et six en arrière.

---

LISTE DES MAMMIFÈRES RAPPORTÉS PAR M. ALLUAUD, DE KHARTOUM  
ET DE SHABLUKA HILLS,

PAR M. E.-L. TROUSSERT.

La mission de M. Alluud ne lui permettait pas de chasser les grands Mammifères, mais les espèces de petite taille qu'il a rapportées dans l'alcool sont toutes intéressantes et plusieurs sont des acquisitions nouvelles pour nos collections. En voici la liste :

1. TAPHOZOUS MAURITIANUS E. Geoffroy. — Khartoum.
2. XERUS ERYTHROPUS LEUCOMBRINUS Rüppel. — Khartoum.
3. GERBILLUS PYGARGUS F. Cuvier. — Khartoum.
4. (DIPODILLUS) WATERSI De Winton. — Shabluka Hills.
5. MUS MUSCULUS GENTILIS Brandt. — Khartoum.

(1) A.-C. LATORRE, Mammifères de Mogador (*Bol. Real Soc. Española de Historia natural*, 1906, p. 357-368; *F. o. mauritana*, n. subsp., p. 362).